

Repetição da

- gabriela ministr
- Jardiel C
- Jacilene Gabriela no caso
- Jardiel C (WhatsA
- Jardiel C específico
- Janner C
- Ermanda
- joao ant
- Jardiel C
- joao ant
- Jardiel C
- Janner C
- Jardiel C
- Janner T poderian

AULÃO DE VÉSPERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ACS e ACE

20 DE MAIO

ÀS 17H

 **YouTube**

JAULACURSOS

igeduc



Julgue os itens subsequentes.

1. Pessoas de todas as idades são suscetíveis ao vírus Influenza, porém alguns grupos são mais propensos a desenvolver formas graves da enfermidade. Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com menos de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos que apresentam doenças crônicas.
2. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível que se cura com uso de antibiótico. Esse tipo de medicação não gera uma proteção para toda a vida, razão pela qual se pode voltar a contrair a infecção.
3. O leite humano pasteurizado no Brasil é seguro e atende, prioritariamente, aos recém-nascidos pré-termos internados em Unidades Neonatais.
4. A transmissão do Coronavírus por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra.
5. O Diabetes Mellitus tipo 1 aparece geralmente na idade adulta. Essa variedade é sempre tratada com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividade física, para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue.
6. A hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com um doente com hanseníase que não está sendo tratado. A transmissão da bactéria *Mycobacterium leprae* pode ocorrer pelas vias respiratórias (pelo ar), e pelos objetos utilizados pelo paciente.
7. O tratamento sistêmico do cancro mole deve ser acompanhado de medidas locais de higiene. O tratamento dos parceiros sexuais é recomendado apenas quando houver sintomatologia clínica.
8. A prevenção do Zika vírus deve incluir o combate ao vetor e o uso de repelentes. Um cuidado especial deve haver em relação às gestantes em razão do risco de malformações congênitas, reforçando-se as medidas de proteção individual.
9. O reservatório da bactéria causadora do cancro mole é o homem, e o contato sexual direto é tido como a única forma de contágio.
10. Apenas as fêmeas do mosquito *Culex* são vetores do

parasito causador da filariose, porque somente elas são hematófagas.

11. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e a Aids surge quando a pessoa se encontra doente, com manifestações decorrentes da presença do vírus no organismo. Assim, toda pessoa infectada pelo HIV é considerada acometida pela Aids.
12. Os indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para Covid-19 devem iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso no 7º dia completo após a data da coleta da amostra, e após realizar novo teste, desde que permaneçam assintomáticos durante todo o período.
13. O cancro mole é uma afecção de transmissão exclusivamente sexual caracterizada por lesões múltiplas (podendo ser única) e habitualmente dolorosas, mais frequentes no sexo masculino.
14. A oftalmia neonatal, definida como conjuntivite purulenta do recém-nascido, ocorre no primeiro mês de vida e pode levar à cegueira, especialmente quando causada pela *Neisseria gonorrhoeae*. Por isso a doença deve ser tratada imediatamente, para prevenir dano ocular.
15. A transmissão da esquistossomose depende da presença do homem infectado, excretando ovos do helminto pelas fezes, e dos caramujos aquáticos, que atuam como hospedeiros definitivos, liberando larvas infectantes do verme nas coleções hídricas utilizadas pelos seres humanos.
16. A imunização para HPV é realizada por meio de vacina quadrivalente, estando indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O esquema é composto de duas doses, com intervalo de seis meses.
17. As gestantes portadoras de herpes simples apresentam risco acrescido de complicações fetais e neonatais, sobretudo quando a infecção ocorre no final da gestação. O maior risco de transmissão do vírus acontece no momento da passagem do feto pelo canal de parto.
18. Acidentes laboratoriais também podem transmitir a doença de Chagas devido ao contato com culturas de *Trypanosoma cruzi*, exposição às fezes de triatomíneos contaminadas ou sangue (de casos humanos ou de animais) contendo formas infectantes do parasito.
19. Um dos principais fatores de risco para o câncer de estômago é uma bactéria – *Helicobacter pylori* – que infecta metade da população mundial e, na maioria dos

casos, não causa sintomas. Em alguns indivíduos, porém, essa bactéria causa úlcera e gastrite.

20. A desnutrição leva a uma série de alterações na composição corporal e no funcionamento normal do organismo. Quanto mais grave for o caso, maiores e também mais graves serão as repercussões orgânicas.

The logo consists of a light blue, irregularly shaped background. Inside this shape, the word "JAUIA" is written in large, bold, white, uppercase letters. Below "JAUIA", the words "Curso Preparatório" are written in a smaller, white, italicized font.

JAUIA
Curso Preparatório